



Paciente con enfermedad cardiovascular aterosclerótica (ECVAe)



Fernando 58 años

- Infarto previo hace 5 años
- Fumador habitual
- HTA mal controlada
- Colesterol total 225 mg/dl
- c-LDL 170 g/dl y c-HDL 45 mg/dl

El paciente con ECVAe se considera directamente de muy alto RCV^{1,2}

RCV MUY ALTO

Paciente joven aparentemente "sano"



Tomás 49 años

- Obesidad
- Hipertensión (PAS 145 mmHg)
- Fumador (20 cigarros/día)
- Colesterol total 250 mg/dl
- c-LDL 150 mg/dl y c-HDL 47 mg/ml

SCORE2* = 7,3 %

RCV ALTO

Paciente con DM2



Lucía 68 años

- DM2 (HbA_{1c} 7 %)
- HTA controlada (PAS 120 mmHg)
- Artrosis incipiente
- Colesterol total 240 mg/dl
- c-LDL 125 mg/dl y c-HDL 51 mg/dl
- FG normal

SCORE2** = 9,6 %

RCV ALTO

Paciente con sospecha de enfermedad arterial periférica (EAP)



Julián 69 años

- EPOC
- HTA controlada (120 mmHg de TAS)
- Colesterol total 240 mg/dl
- c-LDL 110 mg/dl y c-HDL 45 mg/dl
- PCR elevada

SCORE2* = 8,6 %

RCV ALTO

CUANDO SE ELIGE **CRESTOR®**, SE ELIGE MUCHO MÁS QUE UN MEDICAMENTO

El medicamento de marca facilita el reconocimiento del medicamento por parte del paciente y facilita el cumplimiento³



1. Mach F, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020 Jan 1;41(1):111-188. doi: 10.1093/eurheartj/ehz455. 2. Visseren FL, et al. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2022 May;75(5):429. doi: 10.1016/j.rec.2022.04.003. 3. El valor de la marca. Disponible en: Decalogo-El-valor-de-la-marca_Farmaindustria_2024_ok.pdf.

c-HDL: colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad; **c-LDL:** colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad; **DM2:** diabetes mellitus 2; **EPOC:** enfermedad pulmonar obstructiva crónica; **FG:** filtrado glomerular; **HbA_{1c}:** hemoglobina glicosilada; **HTA:** hipertensión; **PAS:** presión arterial sistólica; **PCR:** prueba de proteína C reactiva; **RCV:** riesgo cardiovascular.

*riesgo score2 calculado en:
www.heartscore.org

**riesgo score2-diabetes calculado en:
ESC CVD Risk Calculation App
(www.escardio.org)

Los pacientes de este material son ficticios.



Accede a la ficha técnica de Crestor®

Crestor®: medicamento sujeto a prescripción médica. Especialidad reembolsable por el SNS con aportación normal. Crestor® 5 mg, envase de 28 comprimidos, PVP IVA: 4,76 €, CN: 661858. Crestor® 10 mg, envase de 28 comprimidos, PVP IVA: 9,52 €, CN: 661872. Crestor® 20 mg, envase de 28 comprimidos, PVP IVA: 19,05 €, CN: 661873. Fecha de elaboración del material: noviembre 2025